

**BIJLAGE 1 : De voorwaarden voor een IBR-vrij statuut van een beslag volgens bijlage III uit beschikking 2004/558/EG zijn:**

- I. Voor het verkrijgen van een officieel IBR-vrij statuut van een beslag
  1. Op het beslag werd tijdens de laatste 6 maanden geen verdenking van IBR vastgesteld en alle runderen op het bedrijf zijn vrij van klinische symptomen die wijzen op een infectie met IBR;
  2. Geen contact mogelijk met dieren van een lagere IBR-status;
  3. Enkel aanvoer van runderen uit IBR-vrije beslagen of beslagen uit lidstaten/regio's die officieel vrij zijn;
  4. Vrouwelijke runderen worden uitsluitend bevrucht met IBR-vrij rundersperma of gedekt door stieren uit IBR-vrije beslagen;
  5. Volgend serologisch bloedonderzoek werd toegepast: uitvoering van een serologische test voor de opsporing van antistoffen tegen IBR met telkens negatieve resultaten op minstens twee bloedmonsters, die zijn genomen met een tussenpoos van vijf tot zeven maanden van alle vrouwelijke runderen ouder dan negen maanden en alle mannelijke runderen ouder dan 9 maanden die voor de fok worden gebruikt of zijn bestemd.
- II. Voor het behoud van een IBR-vrij beslag:
  1. Het beslag blijft voldoen aan de punten 1 tot 4 voor het verkrijgen van een vrije status;
  2. Binnen een periode van twaalf maanden wordt een serologische bloedonderzoek uitgevoerd voor de opsporing van antistoffen tegen IBR met telkens negatieve resultaten op minstens één individueel bloedmonster, genomen van alle runderen ouder dan 24 maanden (of een bewakingsprogramma dat gelijkaardige sanitaire garanties biedt bv. via een combinatie van melk- en bloedonderzoek).
- III. De IBR-vrije status van een beslag wordt opgeschort wanneer tijdens het serologisch onderzoek voor de verwerving of het behoud van de status een dier positief heeft gereageerd op een test voor de opsporing van antistoffen tegen IBR.
- IV. De IBR-vrije status wordt opnieuw toegekend na een serologische test voor opsporing van antistoffen tegen IBR die ten vroegste 30 dagen na de verwijdering van de seropositieve dieren met telkens een negatief resultaat is uitgevoerd op minstens twee bloedmonsters die met een tussenpoos van minstens drie maanden zijn genomen van alle vrouwelijke en alle mannelijke runderen.