

## Voorschriften voor vaccinatie van verschillende soorten en categorieën pluimvee tegen Newcastle Disease

Soort	Categorie	Enting	Tijdstip	Vaccin	Methode	
Kippen	Slachtkuikens	1ste enting	1ste dag	Levend vaccin naar keuze	grove spray – volle dosis	
		2de enting	Leeftijd van 10-18 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – volle dosis	
	legkippen kippen afkomstig van pluimveeselectie en vermeerderingsbedrijven voor leg en vleeskippen	1ste enting	Leeftijd van 10-18 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – volle dosis	
		2de enting	Leeftijd van 7 wk	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – volle dosis	
		3de enting	Ogenblik van overplaatsen	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen	
		4de enting en volgende	a) tijdens de leggerperiode is hervaccinatie verplicht wanneer een bloedonderzoek uitgevoerd bij een representatief aantal stuks pluimvee heeft aangetoond dat het koppel onvoldoende immuniteit bezit. Een dergelijk bloedonderzoek moet worden uitgevoerd ten laatste 8 maanden na het begin van de leg			
			b) van uitgeruide koppels	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen	
	sierpluimvee	1ste enting	Sierpluivee dat te koop wordt aangeboden op een markt moet reeds gevaccineerd zijn, met La Sota of gekloneerde La Sota, binnen de drie maanden voorafgaand aan de verkoop			
		herentingen	Jaarlijks tussen juli-september	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen	
	Kalkoenen	slachtkalkoenen	1ste enting	Leeftijd van 10-18 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis
2de enting			Leeftijd van 7 wk	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
3de enting (1)			Leeftijd van 13 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
Reproductiekalkoenen		1ste enting	Leeftijd van 10-18 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		2de enting	Leeftijd van 8-10 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		3de enting	Leeftijd van 17 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		4de enting	Leeftijd van 27 w	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen	
Parelhoenders	Slachtparelhoenders	1ste enting	Leeftijd van 14-21 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		2de enting (2)	Leeftijd van 7-9 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
	Reproductieparelhoenders	1ste enting	Leeftijd van 14-21 d	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		2de enting	Leeftijd van 10-12 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		3de enting	Leeftijd van 17-18 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis	
		4de enting	Leeftijd van 28 w	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen	

Soort	Categorie	Enting	Tijdstip	Vaccin	Methode
<b>Fazanten en patrijzen</b>	Bestemd voor de slacht of voor de jacht	1ste enting	Leeftijd van 2-3 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Drinkwatermethode – volle dosis
		2de enting	Leeftijd van 8-10 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Drinkwatermethode – volle dosis
	Bestemd voor de fokkerij	1ste enting	Leeftijd van 2-3 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Drinkwatermethode – volle dosis
		2de enting	Leeftijd van 8-10 w	La Sota stam of gekloneerde La Sota	Drinkwatermethode – volle dosis
		3de enting	Leeftijd van 18-20 w	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen
<b>Kwartels</b>		enting	Leeftijd van 5-6 w	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen
<b>Pauwen (3)</b>		1ste enting	Leeftijd van 5 w	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen
		Volgende entingen	Jaarlijks tussen juli en september	Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Onderhuids toedienen
<b>Duiven</b>	Deelnemend aan wedstrijden of verzamelingen	1ste enting	3 w voor de eerste wedstrijd of verzameling	La Sota stam of gekloneerde La Sota of geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Volgens voorschriften van vaccin
		Volgende entingen	Jaarlijks, 3 w voor de eerste wedstrijd of verzameling voor het jaar	La Sota stam of gekloneerde La Sota of geïnactiveerd geadjuveerd vaccin	Volgens voorschriften van vaccin

(1) voor kalkoenen die langer dan 15 weken worden gehouden

(2) voor parelhoenders die langer dan 12 weken worden gehouden

(3) met uitzondering van de dwergkwartels die worden gehouden als kleine volièrevogels en niet moeten worden gevaccineerd